## Признаки, по которым можно определить возможное самоубийство:

- Нарушения пищевого поведения: полное отсутствие аппетита или, наоборот, неконтролируемое обжорство.
- Пренебрежительное отношение к собственной внешности: например, неопрятность в одежде в течение нескольких дней.
- Жалобы на физическое состояние: мигрень или боли в животе.
- Отсутствие удовольствия от тех занятий, которые раньше приносили радость.
- Чувство скуки или апатия, непрекращающееся ощущение вины, тотального одиночества.
  - Ухудшение концентрации внимания.
- Вспыльчивость, частые гневные реакции по незначительным причинам



## <u>Причины подросткового</u> суицида:

- Отношения в семье и со сверстниками;
- Наркотики и алкоголь;
- Неприятности с учебой;
- Социальная изоляция;
- Расстройства психики;
- Неудачи в дружбе или любви

**Россия** находится на **6** месте по общему уровню суицидов.

В соответствии с п. 6. ст. 28 «Закона об

образовании в РФ» № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

- создавать безопасные условия обучения, обучающихся, воспитания присмотра и ухода за обучающимися, их В C содержания соответствии установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

# Рекомендации по профилактике детско-подросткового суицидального поведения:

- Нормализация стиля общения педагогов с учащимися, нормализировать его отношения со сверстниками;
- «Вселять» в детей уверенность в свои силы;
- Вовлечение учащихся в социальнозначимые виды деятельности;
- Проведение «Дня здоровья» (беседы о здоровом образе жизни, спортивные мероприятия);
- Информирование обучающихся о детских «телефонах доверия»;

• Привлечение детей «группы риска» к занятиям в кружках и секциях во внеурочное время.

#### Внимание!!!

#### Суицид можно предотвратить!!!

Есть мнение, что если подросток принял решение расстаться с жизнью, то помешать ему уже невозможно. Считается также, что если подростку не удалось покончить с собой с первого раза, он будет совершать суицидальные попытки снова и снова, до тех пор, пока не добьется своего.

В действительности же, молодые люди пытаются, как правило, покончить с собой всего один раз. Большинство из них представляют опасность для самих себя лишь в продолжение короткого промежутка времени — от 24 до 72 часов. Если же кто-то вмешается в их планы и окажет помощь, то вероятнее всего, снова покушаться на свою жизнь они не будут.



Самоубийца - это человек, душа которого погибла в аутокатострофе (\*ayто-caм (греч.autos)).



**Суицид** – умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя жизни).

B 90 % суицидальное поведение подростка — это привлечение к себе внимания ,и только в 10 % - суицидальное поведение имеет цель покончить собой.

В соответствии с п.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья .......

Общероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122

Центр Социальной Адаптации

Телефоны доверия: 27-86-19 27-79-80

Город Березники, Ул. Суворова, 60

#### Прокуратура города Березники

Пермского края РАЗЪЯСНЯЕТ:

## Профилактика суицидов в школе

Памятка для педагогов



«...Самоубийство – мольба о помощи, которую никто не услышал...»

Р. Алеев

г. Березники, 2018